

Αλκαλοποίηση ούρων (Αν.1.1)

Potassium Citrate	
Citric Acid Monohydrate	
Water Purif ad	

Χρήσεις: Κυστινουρία, Ουρική λιθίαση

Σημειώσεις: Να αραιώνεται σε αρκετή ποσότητα νερού λίγο πριν τη λήψη. Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να αποφεύγεται η ψύξη του διαλύματος. Ο ασθενής χρησιμοποιεί pH-μετρικό χαρτί μέχρι να επιτύχει το επιθυμητό pH (~6.7-7, η ακριβής τιμή ορίζεται από τον ιατρό). Συνήθης έναρξη θεραπείας με 2.5 ml x 3 φορές την ημέρα. Πρέπει να προηγηθεί μέτρηση pH πριν την έναρξη της θεραπείας. Για παιδιατρική χρήση, εφόσον είναι επιθυμητό, μπορεί να προστεθεί ζάχαρη.

Οξινοποίηση των ούρων, διατήρηση άσηπτων ούρων, φωσφορική λιθίαση (Αν.1.2)

Caps L-Methionine	
-------------------	--

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 caps x 3 φορές την ημέρα

Στενώματα ουρήθρας (Αν.1.3)

Vibramycin	
Hydrocortisone	
Lubricating Jelly ad.	

Σημειώσεις: Εφαρμόζεται μετά από επεμβάσεις στην ουρήθρα για να εμποδίσει τη δημιουργία στενωμάτων. Χρησιμοποιείται σύριγγα των 10 cc (χωρίς βελόνα). Διατηρείται στο ψυγείο για 10 ημέρες.

Ουρολιθιάσεις (Αν.1.4)

Extr. Rad. Rubiae Tinct. Spir. (7:1)	
Extr. Sem. Ammeos Visnagae Spir. (10:1)	
Extr. Herb. Virgaurae Spir. (6:1)	
Extr. Rad. Taraxaci cum Herb Spir. (5:1)	
Aescin	
Excip. q.s.	

Σημειώσεις: Για αποβολή άμμου και μικρών λίθων. Χρήση μετά από λιθοτριψίες και εφ όσον το επιτρέπει το μέγεθος των θρυμμάτων (εκτίμηση του ιατρού). Συνήθης δοσολογία 2 caps x 3 φορές την ημέρα για 10 ημέρες.

Χρόνιες αμικροβιακές προστατίτιδες (Αν.1.5)

Ichthammol (Ichthyol Natrium)	
Novata BCF q.s. ad	

Σημειώσεις: Υπόθετα. Συνήθης δοσολογία 1 sup. x 2 φορές την ημέρα.

Αντισηψία ουροποιητικού (Αν.1.6)

Susp. Nitrofurantoin	
----------------------	--

Σημειώσεις: Σιρόπι για παιδιά και ενήλικες που δυσκολεύονται στην κατάποση. Για παιδιατρική χρήση απαιτείται προσαρμογή στην περιεκτικότητα. Δοσολογία σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού.

Υπογονιμότητα, ασθenoσπερμία, διαταραχές ρευστοποίησης σπέρματος, ολιγοσπερμία, τερατοσπερμία (Αν. 2.1)

L- Arginine	
Zinc Sulphate	
Pyridoxine HCL	
Vitamine E dry powder (50%)	
Magnesium Carbonate	
Selenium	
Aerosil Excip.	

L-Carnitine	
-------------	--

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 Caps x 3 φορές την ημέρα για το μίγμα αργινίνης. Για ταχύτερα αποτελέσματα χορηγείται παράλληλα καρνιτίνη με συνήθη δοσολογία 2 gr/ημέρα.

Ήπια στυτική δυσλειτουργία (Αν.2.2)

Damiana feuille	
Pyridoxine HCl	
Vitamine E dry powder	
Zinc Sulphate	
Ginseng Radix	
Excip q.s.	

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 caps x 3 φορές την ημέρα. Το ίδιο σκεύασμα γίνεται με προσθήκη ιοχμβίνης με συνήθη δοσολογία 1 caps x 2 φορές την ημέρα.

Ήπια στυτική δυσλειτουργία. Ασθenoσπερμία (Αν.2.3)

L-Arginine HCl	
Vitamine E dry powder (50%)	

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία 1 caps x 3 φορές την ημέρα.

Στυτική δυσλειτουργία (Αν.2.4)

Yohimbine powder	
Excip q.s.	

Σημειώσεις: Παρασκευάζεται σύμφωνα με την περιεκτικότητα που επιλέγει ο ιατρός. Συνήθης δόση από 5 mg έως 12 mg. Η δοσολογία εξατομικεύεται. Ασφαλής δόση τα 5 mg x 3 φορές την ημέρα. Αντενδείκνυται σε νεφρική και υπατική ανεπάρκεια.

Στυτική δυσλειτουργία – Ενέσιμα (Αν.2.5)

Alprostadil (PGE1)	
--------------------	--

Papaverine 4%	
PGE1	

Papaverine 4%	
Phentolamine 1%	
PGE1	

Papaverine 4%	
Phentolamine 1%	
PGE1 (4-1-0.2)	

Σημειώσεις: Οι μονάδες επιλέγονται από τον ιατρό μετά από δοκιμή. Παρασκευάζονται σε προγεμισμένες σύριγγες ή σε αμπούλες. Διατηρούνται στο ψυγείο για ένα μήνα.

Θεραπεία κονδυλωμάτων (Αν.3.1)

Podophyllin	
Benzoin Tinct.	

Σημειώσεις: Προσοχή- Καυστικό διάλυμα. Εφαρμογή συνήθως μία φορά την ημέρα.

Διάγνωση κονδυλωμάτων (Αν.3.2)

Sol. Acid Acetic	
------------------	--

Σημειώσεις: Για ιατρική χρήση μόνο! Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους. Παρασκευάζεται σε περιεκτικότητες από 5% έως 8%.

Αιματώματα, Οιδήματα (Αν.3.3)

Heparin Sodium Ointment	
-------------------------	--

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία, εφαρμογή 1-2 φορές την ημέρα.

Στυπτική επούλωτική κρέμα μετά από μικροεπεμβάσεις (Αν.4.1)

Almond Oil	
------------	--

Germ Oil	
----------	--

Sorbitol	
----------	--

Calamine	
----------	--

Salcare AST	
-------------	--

Water ad.	
-----------	--

Σημειώσεις: Συνήθης δοσολογία – εφαρμογή 2 φορές την ημέρα.

Έλκη από κατακλίσεις (Αν.4.2)

Zinc Paste	
------------	--

Σημειώσεις: Εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία επαφής του σώματος του ασθενούς με το στρώμα. Κατάλληλο για πρόληψη και για ανοιχτά έλκη. Για έλκη με μεγάλο βάθος υπάρχει δυνατότητα προσθήκης μετρονιδαζόλης σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Gel για υπερηχογραφικές εξετάσεις (Αν.4.3)

Lubricating Gel	
-----------------	--

Σημειώσεις: Για χρήση σε ιατρεία. Ποσότητα κατόπιν συννεοήσεως.